



Laserbehandling af kønsvorter (kondylomer)

Kønsvorter

Kønsvorter forårsages af virus, som tilhører familien humant papillom virus, også kaldet HPV. Virus smitter ved seksuel kontakt, og nogle smittede udvikler kønsvorter.

Behandlingen af disse kan i nogle tilfælde være langvarig og tidskrævende. Sædvanligvis starter man med at påføre en opløsning af podophyllotoxin (Wartec eller Condylone), og hvis der ikke er effekt i løbet af nogle måneder, kan man skifte til frysebehandling, imiquimod (Aldara), kirurgisk fjernelse eller laserbehandling.

Laserbehandlingen

Ved behandling af kondylomer med CO2 laser bliver de enkelte kønsvorter opvarmet, så de enten bliver grålige eller brændes helt væk. Forud for behandlingen anlægges lokalbedøvelse i området. Oftest er en behandling ikke tilstrækkelig, og normalt tilbydes op til 4 behandlinger med ca. 1 måneds mellemrum.

Før behandlingen

Man skal have foretaget en HIV test, der skal være negativ. Hos HIV-positive er behandlingen oftest virkningsløs og der er risiko for smitte af behandleren via røgen fra laserbehandlingen.

Hvis EMLA creme bruges som lokalbedøvelse skal den sidde tildækket i et tykt lag i ca. 1 time.

Efter behandlingen

Der vil være nogen sårdannelse. Det er vigtigt, at der ikke kommer infektion, og man skal derfor vaske med vand og sæbe 1 gang daglig, samt evt. bruge desinficerende klorhexidin creme. Ved smerter kan bruges tablet Panodil op til 1 g fire gange i døgnet til voksne.

Effekt af behandlingen

De fleste kondylomer forsvinder enten under behandlingen eller i månederne efter. Der er dog en mindre del, som ikke har god effekt af behandlingen og/eller bliver ved med at danne nye kønsvorter, således at vedvarende behandling er nyttesløs.

Bivirkninger

Da laseren forårsager en brænding af vævet, kan behandlingen efterlade langvarige eller blivende

pigmentforstyrrelser og i nogle tilfælde arvæv. Der kan forekomme infektion i det behandlede område.